

به نام خداوند بخشنده مهربان



تست آسیب شناسی روانی

مجموعه:

روانشناسی

مؤلف:

گروه مولفان

به سرپرستی دکتر محمدی

آمادگی آزمون ارشد و دکتری

گروه مولفان

بانک تست آسیب‌شناسی روانی / گروه مولفان به سرپرستی دکتر محمدی

تهران - مشاوران صعود ماهان: ۱۴۰۲

۱۸۷ص: جدول، نمودار، (آمادگی آزمون دکتری)

ISBN/N: 978-600-458-695 -5

شابک

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا مختصر

فارسی - چاپ اول

۱- بانک تست آسیب‌شناسی روانی

۲- آزمون‌ها و تمرین‌ها

۲- آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی

۴- دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها

ج - عنوان

شماره کتابشناسی ملی



انتشارات مشاوران صعود ماهان



- نام کتاب: بانک تست آسیب‌شناسی روانی
- مدیران مسئول: مجید و هادی سیاری
- مولفین: گروه مولفان به سرپرستی دکتر محمدی
- مدیر برنامه ریزی و تولید محتوا: سمیه بیگی
- ناشر: مشاوران صعود ماهان
- نوبت و تاریخ چاپ: اول / ۱۴۰۲
- تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
- قیمت: ۲/۳۹۰ / ۰۰۰ ریال
- شابک: ISBN ۹۷۸-۶۰۰-۴۵۸-۶۹۵-۵

انتشارات مشاوران صعود ماهان: تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع ولیعصر مطهری، پلاک ۲۰۵۰

تلفن: ۸۸۱۰۰۱۱۳ و ۸۸۴۰۱۳۱۳

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ماهان می‌باشد. و هرگونه اقتباس و کپی‌برداری از این اثر بدون اخذ مجوز پیگرد قانونی دارد.

بنام خدا

ایمان داریم که هر تغییر و تحول بزرگی در مسیر زندگی بدون تحول معرفت و نگرش میسر نخواهد بود. پس بیایید با اندیشه توکل، تفکر، تلاش و تحمل در توسعه دنیای فکریمان برای نیل به آرامش و آسایش توأمان اولین گام را برداریم. چون همگی یقین داریم دانایی، توانایی می‌آورد

نشاد باشید و دلی را نشاد کنید

برادران سیاری

فهرست مطالب

فصل اول - تاریخچه آسیب‌شناسی روانی	۶
فصل دوم - طبقه‌بندی، تشخیص و درمان	۷
فصل سوم - روش‌های تحقق در روان‌شناسی	۱۱
فصل چهارم - سنجش و ارزیابی بالینی	۱۲
فصل پنجم - علائم و نشانه‌ها در روان‌پزشکی	۱۶
فصل ششم - دیدگاه‌های نظری درباره اختلالات روانی و روش‌های درمانی آن‌ها	۲۲
فصل هفتم - اختلالات عصبی - رشدی	۲۴
فصل هشتم - طیف اسکیزوفرنی و اختلالات روان‌پریشی دیگر	۳۴
فصل نهم - دوقطبی و اختلالات مرتبط	۳۹
فصل دهم - اختلالات افسردگی	۴۲
فصل یازدهم - اختلالات اضطرابی	۴۷
فصل دوازدهم - وسواس فکری - عملی و اختلالات مرتبط	۵۲
فصل سیزدهم - اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس‌زا	۵۷
فصل چهاردهم - اختلالات تجزیه‌ای / گسستگی	۶۱
فصل پانزدهم - اختلالات نشانه جسمانی و اختلالات مرتبط	۶۶
فصل شانزدهم - اختلالات تغذیه و خوردن	۷۰
فصل هفدهم - اختلالات دفعی	۷۳
فصل هجدهم - اختلالات خواب و بیداری	۷۵
فصل نوزدهم - اختلالات عصبی - شناختی	۸۴
فصل بیستم - کژکاری‌های جنسی (اختلالات عملکرد جنسی)	۹۰
فصل بیست و یکم - نارضایتی (ملال جنسیتی)	۹۲
فصل بیست و دوم - اختلالات نابهنجاری جنسی (پارافیلیک)	۹۴
فصل بیست و سوم - اختلالات اخلاک‌گر، کنترل تکانه و سلوک	۹۷
فصل بیست و چهارم - اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد	۱۰۰
فصل بیست و پنجم - اختلالات شخصیت	۱۰۳
پاسخ تست‌های فصل اول	۱۰۴
پاسخ تست‌های فصل دوم -	۱۰۹
پاسخ تست‌های فصل سوم	۱۱۲
پاسخ تست‌های فصل چهارم	۱۱۴
پاسخ تست‌های فصل پنجم	۱۱۷
پاسخ تست‌های فصل ششم	۱۲۱
پاسخ تست‌های فصل هفتم	۱۲۴
پاسخ تست‌های فصل هشتم	۱۳۲
پاسخ تست‌های فصل نهم	۱۳۶
پاسخ تست‌های فصل دهم	۱۳۸
پاسخ تست‌های فصل یازدهم	۱۴۰
پاسخ تست‌های فصل دوازدهم	۱۴۴
پاسخ تست‌های فصل سیزدهم	۱۴۸



۱۵۱	پاسخ تست‌های فصل چهاردهم
۱۵۵	پاسخ تست‌های فصل پانزدهم
۱۵۷	پاسخ تست‌های فصل شانزدهم
۱۶۰	پاسخ تست‌های فصل هفدهم
۱۶۱	پاسخ تست‌های فصل هجدهم
۱۶۸	پاسخ تست‌های فصل نوزدهم
۱۷۲	پاسخ تست‌های فصل بیستم
۱۷۳	پاسخ تست‌های فصل بیست و یکم
۱۷۵	پاسخ تست‌های فصل بیست و دوم
۱۷۷	پاسخ تست‌های فصل بیست و سوم
۱۷۹	پاسخ تست‌های فصل بیست و چهارم
۱۸۲	پاسخ تست‌های فصل بیست و پنجم

فصل اول: تاریخچه آسیب‌شناسی روانی

۱. کدام گزینه زیر جزء A ۴ بلولر نیست؟
 - (۱) حالت عاطفی (۲) افسردگی (۳) در خودماندگی (۴) دودلی
۲. کدام سنخ بدنی به احتمال بیشتری به اختلال دوقطبی مبتلا می‌شود؟
 - (۱) آستنیک (۲) آلتیک (۳) دیسپلاستیک (۴) پیکنیک
۳. کدام گزینه جزء درجه اول اشنايدر نیست؟
 - (۱) شنیدن صدای افکار خود
 - (۲) شنیدن صداهایی که با هم بحث و یا جدل می‌کنند
 - (۳) احساس گم‌گشتگی
 - (۴) تجاربی از احساس انفعال در بدن خود
۴. کدام دانشمند و در چه قرنی اولین کوشش‌های جدی برای بهبود وضع و درمان بیماران روانی در اروپا به عمل آورد؟
 - (۱) پینل-۱۸ (۲) پینل-۲۰ (۳) کراپلین-۱۸ (۴) کراپلین-۲۰
۵. در کدام معیار از رفتار نابهنجاری یا غیرعادی نسبت به درجه ناراحتی و اختلالی که فرد مبتلا به آن احساس می‌کند توجه می‌شود؟
 - (۱) شباهت خانوادگی (۲) اجتماعی (۳) بالینی (۴) آماری
۶. بددهنی غیرارادی (coprophrasia) در کدام اختلالات زیر دیده می‌شود؟
 - (۱) اسکیزوفرنی-توره
 - (۲) GAD-PTSD
 - (۳) اختلال نشانه جسمانی - اختلال هویت تجزیه‌ای
 - (۴) دوقطبی-ADHD
۷. همه انتقال‌دهنده‌های زیر در اسکیزوفرنی افزایش می‌یابد به جز؟
 - (۱) دوپامین (۲) نوروپپتیدها (۳) سروتونین (۴) گلوتامات
۸. «انقلاب اول» روان‌پزشکی چه بود؟
 - (۱) برداشتن زنجیرهای دیوانگان
 - (۲) ECT
 - (۳) داروها
 - (۴) نظریه فروید
۹. کدام یک جزء عناصر هیجانی ترس نیست؟
 - (۱) دلهره (۲) تهوع (۳) لرزش (۴) پرخاشگری
۱۰. مهم‌ترین انتقال‌دهنده درگیر در سبب‌شناسی وسواس کدام گزینه است؟
 - (۱) گابا (۲) اپی‌نفرین (۳) سروتونین (۴) دوپامین
۱۱. اشکال در واژه‌یابی مربوط به کدام اختلال زیر است؟
 - (۱) زبان‌پریشی اسمی (۲) زبان‌پریشی نامفهوم (۳) زبان‌پریشی رسانشی (۴) زبان‌پریشی ورنیکه
۱۲. زبان‌پریشی دریافتی به علت اختلال در کدام قسمت مغز ایجاد می‌شود؟
 - (۱) ناحیه ورنیکه (۲) ناحیه بروکا (۳) راه کمانی (۴) شکنج آنگولار
۱۳. در کدام نوع زبان‌پریشی تکرار شدیداً مختل می‌شود اما درک شنوایی خوب است؟
 - (۱) زبان‌پریشی حرکتی بین نیمکره‌ای (۲) زبان‌پریشی رسانشی (۳) زبان‌پریشی حسی بین نیمکره‌ای (۴) زبان‌پریشی نامی

۱۴. کدام گزینه جزء علائم درجه دوم شنايدر است؟

- (۱) افکار هذیانی ناگهانی
- (۲) سایر اختلالات ادراکی
- (۳) تغییرات خلقی به صورت افسردگی و سرخوشی
- (۴) ادراک‌های هذیانی

۱۵. کدام گزینه در مورد حسادت صحیح نیست؟

- (۱) حسادت غالباً با ترس درونی و خشم توأم است.
- (۲) بین سنین ۵ تا ۱۰ سالگی حسادت واکنشی طبیعی است.
- (۳) بهترین روش پی بردن به حسادت، نقاشی و بازی درمانی است.
- (۴) تنبیه کودک به علت حسادت باعث تبدیل رقابت به دشمنی و انتقام‌جویی می‌گردد.

۱۶. کدام گزینه زیر جزء طر حواره‌های قطع ارتباط شناختی نیست؟

- (۱) حالت دفاعی
- (۲) بی‌کفایتی
- (۳) محرومیت
- (۴) غفلت

۱۷. کدام گزینه جزء طر حواره‌های ارتباط بیش‌ازاندازه نیست؟

- (۱) بهره‌کشی
- (۲) استقلال معیوب
- (۳) آسیب‌پذیری
- (۴) وابستگی

۱۸. کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

- (۱) مردان ۴ برابر بیشتر از زن‌ها خودکشی می‌کنند.
- (۲) مردان ۴ برابر بیشتر از زنان اقدام به خودکشی می‌کنند.
- (۳) ازدواج و بچه‌دار شدن خطر خودکشی را افزایش می‌دهد.
- (۴) هر قدر مفادیر اجتماعی شخصی بالاتر باشد خطر خودکشی کمتر است.

۱۹. در کدام اختلال، بیمار نسبت به اختلال خود هوشیار است؟

- (۱) پارانویا
- (۲) هیستری
- (۳) خودشیفته
- (۴) وسواسی-جبری

فصل دوم: طبقه‌بندی، تشخیص و درمان

۲۰. تاریخ انتشار DSM-5 و ICD-10 به ترتیب چه سالی است؟

- (۱) ۲۰۱۳-۲۰۱۳
- (۲) ۲۰۱۴-۲۰۱۳
- (۳) ۲۰۱۳-۲۰۱۴
- (۴) ۲۰۱۴-۲۰۱۴

۲۱. کدام گزینه جزء تغییرات DSM-5 نیست؟

- (۱) استفاده از سیستم غیر محوری
- (۲) رویکرد رشدی و رویکرد لایف تایم
- (۳) رویکرد مقوله‌ای به اختلالات روانی (طبقاتی)
- (۴) سنجش ابعادی و سنجش متقاطع

۲۲. کدام گزینه زیر درست نیست؟

- (۱) حذف سیستم چند محوری باعث شده است DSM-5 با WHO تفاوت زیادی داشته باشد.
- (۲) مقیاس سنجش کلی عملکرد (محور V) در DSM-5 حذف شده است
- (۳) فهرست مشکلات روانی اجتماعی و محیطی در DSM-5 با دو کد توسعه یافته است: کد V برای DSM-5 و کد Z برای ICD-10
- (۴) محور I، محور II را با همه دیگر اختلالات روانی و پزشکی را ترکیب می‌کند

۲۳. در DSM-5 کدام سنجش مربوط به اختلال خاصی نیست زیرا از مرزهای همه اختلالات روانی عبور می‌کند؟
(۱) متقاطع (۲) پیوستاری (۳) بعدی (۴) طیفی
۲۴. کدام توهم در اختلالات عضوی شایع‌تر است؟
(۱) شنوایی-بویایی (۲) جسمی-شنوایی (۳) چشایی-بویایی (۴) جسمی-چشایی
۲۵. سرکوب (suppression) تحت عنوان کدام گروه از مکانیسم‌های دفاعی به شمار می‌آید؟
(۱) شنوایی (۲) ناپخته (۳) خودشیفته‌وار (۴) کمال‌یافته
۲۶. «تشنجی که در آن عضلات به طور متناوب منقبضی و شل می‌شود» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) تشنج کلونیک (۲) تشنج تونیک-کلونیک (۳) تشنج تونیک (۴) تشنج کاذب
۲۷. «تشنجی که در آن انقباض عضلانی دوام می‌یابد» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) داء‌الرقص (۲) تشنج تونیک (۳) حمله صرعی موضعی پیچیده (۴) حمله صرعی موضعی ساده
۲۸. کدام گزینه در مورد حمله صرعی تونیک-کلونیک صحیح نیست؟
(۱) اسم دیگر آن صرع گراند‌مال است
(۲) به آن صرع روانی-حرکتی نیز می‌گویند.
(۳) پس از حرکات تونیک-کلونیک اعضا به سرعت هشیاری و شناخت بهبود می‌یابد.
(۴) این نوع صرع همراه با گاز زدن زبان و ناخودداری است.
۲۹. «شروع حمله ناگهانی موضعی بدون تغییرات هوشیاری» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) حمله صرعی موضعی ساده (۲) تشنج
(۳) حمله صرعی تونیک-کلونیک منتشر (۴) حمله صرعی موضعی پیچیده
۳۰. «شروع حمله ناگهانی موضعی با تغییرات هوشیاری» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) حمله صرعی موضعی ساده (۲) حمله صرعی موضعی پیچیده
(۳) اختلال تونوس (۴) تشنج کلونیک
۳۱. همه داروهای زیر جزء داروهای نامتعارف یا نسل اول هستند به جزء؟
(۱) کلوزاپین (۲) کلرپرومازین (۳) فلوفنازین (۴) هالوپریدول
۳۲. همه داروهای زیر جزء داروهای ضد روان‌پریشی نامتعارف یا نسل دوم هستند به جزء؟
(۱) اولانزاپین (۲) هالوپریدول (۳) کویتاپین (۴) ریسپریدون
۳۳. در اختلال وسواسی - جبری کدام انتقال‌دهنده عصبی دخیل است؟
(۱) دوپامین (۲) گابا (۳) سروتونین (۴) آدرنالین
۳۴. کاریوتیپ سندروم کلاین فیلتر و سندروم ترنر به چه صورت است؟
XX-XY (۲) XXY-XO (۱)
XO-XXY (۴) XXY-XX (۳)
۳۵. کدام گزینه در مورد سندروم گریستن صحیح نیست؟
(۱) نشناسی انگشتان دارد (۲) اختلال محاسبه و اختلال در نوشتن دارد
(۳) اختلال جهت‌یابی راست و چپ دارد (۴) در سندروم گریستن نیمکره راست درگیر است.
۳۶. مصرف کدام یک از داروهای زیر کنترل هفتگی گلبول‌های سفید را ایجاد می‌کند؟
(۱) ریسپریدون (۲) کلرپرومازین (۳) کلوزاپین (۴) اولانزاپین
۳۷. کدام یک از ناقل‌های عصبی زیر نقش اساسی در تعدیل مرکزی درد ایفا می‌کند؟
(۱) دوپامین (۲) گابا (۳) اندورفین (۴) استیل‌کولین

۳۸. کدام گزینه در مورد سندروم خستگی مزمن صحیح نیست؟

- (۱) علائمی مانند خستگی شدید، سردرد، مشکلات شناختی، اختلال خواب حداقل باید ۶ ماه تداوم داشته باشد
- (۲) فرسودگی شدید روانی و جسمی ۵۰ درصد فعالیت‌های بیمار را کاهش می‌دهد
- (۳) مردان ۲ برابر زنان بیشتر دچار این اختلال می‌شوند
- (۴) ۸۰ درصد بیماران مبتلا واجد ملاک‌های افسردگی اساسی هستند.

۳۹. شیوع سندروم خستگی مزمن..... است و در معمولاً در افراد..... مشاهده می‌شود.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (۱) $\frac{1}{100}$ - ۲۰ تا ۴۰ سال | (۲) $\frac{1}{1000}$ - ۴۰ تا ۶۰ سال |
| (۳) $\frac{1}{100}$ - ۴۰ تا ۶۰ سال | (۴) $\frac{1}{1000}$ - ۲۰ تا ۴۰ سال |

۴۰. کدام گزینه زیر صحیح است؟

- (۱) تشخیص سندروم خستگی مزمن در صورتی مطرح می‌شود که همه علل طبی و روانی دیگر کنار گذاشته شود.
- (۲) درمان خستگی مزمن اساساً حمایتی است.
- (۳) برخی مطالعات علت سندروم خستگی مزمن را تخلیه مواد غذایی سلول عصبی بر اثر استرس‌های چون کار اضافی می‌دانند.
- (۴) در بیماران سندروم خستگی مزمن علاج خودبه‌خودی شایع است.

۴۱. کدام گزینه زیر در نشانگان بدخیم داروی ضد روان‌پریشی صحیح نیست؟

- (۱) نشانگان بدخیم داروی ضد روان‌پریشی در اغلب موارد محدود است.
- (۲) اغلب افراد ظرف ۱ هفته و تقریباً همه ظرف ۳۰ روز بهبود می‌یابند
- (۳) تمام آنتاگونیست‌های سروتونین با نشانگان بدخیم داروی ضد روان‌پریشی ارتباط دارد.
- (۴) میانگین زمان بهبود بعد از قطع دارو ۷ تا ۱۰ روز است.

۴۲. همه داروهای زیر جزء ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای محسوب می‌شود به جزء؟

- | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| (۱) ایمی‌پرامین | (۲) دسی‌پرامین | (۳) فلوکستین | (۴) آمی‌تریپتیلین |
|-----------------|----------------|--------------|-------------------|

۴۳. همه گزینه‌های زیر جزء بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز است به جزء؟

- | | | | |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| (۱) ریسپریدون | (۲) فنلزین | (۳) پاراگیلین | (۴) سلگینیلین |
|---------------|------------|---------------|---------------|

۴۴. همه داروهای زیر جزء بازدارنده‌های باز جذب سروتونین محسوب می‌شود به جزء؟

- | | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| (۱) پاروکستین | (۲) فلوکستین | (۳) سرترالین | (۴) ریتالین |
|---------------|--------------|--------------|-------------|

۴۵. WHO یک سیستم..... است

- | | | | |
|-----------|---------------|-----------|-------------|
| (۱) محوری | (۲) غیر محوری | (۳) محوری | (۴) ۳ محوری |
|-----------|---------------|-----------|-------------|

۴۶. در DSM-5 سطوح مختلف شدت بر اساس..... تعیین شده نه بر پایه.....

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| (۱) عملکرد انطباقی-نمرات هوش‌بهر | (۲) زمینه اجتماعی-زمینه عملی |
| (۳) زمینه عملی-زمینه اجتماعی | (۴) نمرات هوش‌بهری-عملکرد انطباقی |

۴۷. فنون «وارونه‌سازی عادت» در درمان کدام اختلال زیر کاربرد دارد؟

- | | |
|----------|--------------------------|
| (۱) تیک | (۲) اختلال اضطراب فراگیر |
| (۳) ADHD | (۴) Odd |

۴۸. تشنج درمانی الکتریکی (ECT) در درمان کدام اختلال به کار نمی‌رود.

- | | |
|-----------------------|------------------|
| (۱) PTSD | (۲) افسردگی شدید |
| (۳) اختلال خلق شیدایی | (۴) کاتاتونیا |

۴۹. روش «تعقیب سایه به سایه» shadowing در درمان کدام اختلال به کار می‌رود؟

- | | | | |
|---------|----------|------------|---------------|
| (۱) تیک | (۲) ADHD | (۳) اوتیسم | (۴) لکنت زبان |
|---------|----------|------------|---------------|

۵۰. کدام گزینه درست نیست؟

- (۱) لوپوس اریتماتو سیستمی در مردان شایع‌تر است
- (۲) ارتباط نشانه‌های اضطرابی در اختلالات افسردگی رایج است
- (۳) بیشترین خطر افسردگی اساسی با سکنه‌های پیشانی چپ دارد
- (۴) بین بیماری‌های جسمانی جدی و خودکشی ارتباط آشکار وجود دارد

۵۱. کدام گزینه صحیح نیست؟

- (۱) یک‌سوم سالمندان تنهایی را علت اصلی تفکر در مورد خودکشی ذکر می‌کنند.
- (۲) حدود ۶۰ درصد افرادی که مرتکب خودکشی موفق می‌شوند مرد هستند.
- (۳) مشکلات جسمی یکی از عوامل زمینه‌ساز خودکشی در افراد جوان است.
- (۴) قربانیان خودکشی اصولاً از اسلحه گرم استفاده می‌کنند.

۵۲. در کودکان مبتلا اوتیسم و عادی تفاوت‌های را در کدام انتقال‌دهنده عصبی نشان می‌دهند؟

- (۱) دوپامین و سروتونین
- (۲) نورآدرنالین و سروتونین
- (۳) سروتونین و استیل‌کولین
- (۴) اپی‌نفرین و دوپامین

۵۳. کدام گزینه زیر قلب دستگاه لیمبیک محسوب می‌شود؟

- (۱) آمیگدال
- (۲) بادامه
- (۳) هیپوکامپ
- (۴) سینگولا

۵۴. بدترین اثر جانبی داروهای آنتی‌سایکوتیک کدام است؟

- (۱) دیسکینزی دیررس
- (۲) فشارخون پایین
- (۳) ضریان قلب نامنظم
- (۴) لرزش

۵۵. تشخیص افتراقی اختلال افسردگی اساسی از اختلال اضطراب اجتماعی در همه گزینه‌ها مطرح شده است به جز؟

- (۱) افراد اختلال اضطراب اجتماعی به دلیل رفتارها یا نشانه‌های جسمانی خاص از ارزیابی شدن منفی نگران هستند
- (۲) افراد افسرده به دلیل اینکه احساس بی‌ارزشی می‌کنند در مورد ارزیابی شدن منفی نگران هستند
- (۳) افراد افسرده به دلیل اینکه احساس می‌کنند بد هستند در مورد ارزیابی شدن منفی نگران هستند
- (۴) افراد اختلال اضطراب اجتماعی ترس و اجتناب آن‌ها فقط توسط عقاید آنها در مورد ظاهرشان ایجاد شده است

۵۶. مغز قربانیان خودکشی در و سروتونین کمتری دارد.

- (۱) ساقه مغز-مایع مغزی نخاعی
- (۲) پیشانی-گیجگاهی
- (۳) ساقه مغز-پیشانی
- (۴) مایع مغزی نخاعی-گیجگاهی

۵۷. اختلالات اضطرابی در DSM-IVR اکنون در DSM-5 به سه گروه تقسیم شده‌اند کدام گزینه جز این سه دسته نیست؟

- (۱) اختلالات اضطرابی
- (۲) اختلال وسواسی - اجباری و اختلالات مرتبط با آن
- (۳) دوقطبی و اختلالات مربوط
- (۴) اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس‌زا

۵۸. کدام یک از ویژگی‌های خود ذهنی است؟

- (۱) نفوذ
- (۲) وحدت شخصی
- (۳) سهیم شدن در توجه
- (۴) استفاده از نمادها

فصل سوم: روش‌های تحقیق در روان‌شناسی

۵۹. کدام مطالعه به «مطالعات شیوع» معروف است؟

- (۱) مورد مشاهده (۲) کارآزمایی بالینی (۳) موردی (۴) مقطعی

۶۰. «مفهوم بودن آزمون برای پژوهشگری که آن را به کار می‌برد» تعریف کدام است؟

- (۱) اعتبار صوری (۲) اعتبار ملاک (۳) اعتبار همگام (۴) اعتبار محتوا

۶۱. «میزان ارتباط نتایج آزمون با نتایج آزمون دیگر همان متغیر است» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) اعتبار همگام (۲) اعتبار محتوا (۳) اعتبار ملاک (۴) اعتبار سازه

۶۲. «آیا آزمون انواع خاص اطلاعات را که بعداً بتوان تفسیر یا درجه‌بندی کرد در بر می‌گیرد یا خیر» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) اعتبار محتوا (۲) اعتبار صوری (۳) پایایی (۴) اعتبار ملاک

۶۳. کدام گزینه بیانگر جمله زیر است؟

«هویت گروهی ساخته شده به صورت فرهنگی است که برای توصیف کردن افراد و جوامع به کار می‌رود».

- (۱) نژاد (۲) گروه (۳) قومیت (۴) فرهنگ

۶۴. «نمرات خیلی بالا به خاطر هنجارهای آزمون منسوخ» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) تأثیرات تمرین (۲) برگشت آماری (۳) اثر فلین (۴) اثر هاتورن

۶۵. «آزمون تا چه اندازه‌ای ویژگی روانی به دست آمده از نظریه را اندازه‌گیری می‌کند» ویژگی کدام نوع روایی است؟

- (۱) محتوا (۲) سازه (۳) ملاک (۴) پیش‌بینی

۶۶. کدام گزینه درباره نژاد صحیح نیست؟

- (۱) ساختار نژاد تعریف زیستی با ثبات دارد.
(۲) نژاد از لحاظ اجتماعی مهم است.
(۳) طبقه ساخته شده به صورت فرهنگی در مورد هویت است که انسان را بر مبنای انواع صفات جسمانی سطحی تقسیم می‌کند.
(۴) نژاد را ناشی از ویژگی‌های درونی زیستی فرضی تقسیم می‌کنند.

۶۷. کدام گزینه زیر جزء دفاع‌های ناپخته نیست؟

- (۱) خودبیمارانگاری
(۲) جنسی‌سازی (sexualization)
(۳) پسرفت (regression)
(۴) رفتار پرخاشگری انفعالی (passive aggressive)

۶۸. کدام گزینه بیانگر جمله زیر است؟

«به نظام‌های آگاهی، مفاهیم، مقررات و رسومی اشاره دارد که آموخته شده و بین نسل‌ها انتقال یافته‌اند»

- (۱) اقوام (۲) قومیت (۳) نژاد (۴) فرهنگ

۶۹. «اشتغال ذهنی با دنیای درونی و خصوصی» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) اختلال تفکر صوری (۲) تفکر اوتیستیک
(۳) تفکر غیرمنطقی (۴) تفکر جادویی

۷۰. آسیب کدام منطقه موجب زبان‌پریشی دریافتی می‌شود؟

- (۱) ورنیکه (۲) بروکا (۳) گیجگاهی چپ (۴) آهیانه چپ

۷۱. علت آکرومگالی در کدام گزینه مطرح شده است؟

- (۱) ترشح زیاد هورمون هیپوفیز
(۲) ترشح کم هورمون هیپوفیز
(۳) ترشح زیاد هورمون تیروئید
(۴) ترشح کم هورمون تیروئید

۷۲. احساس خزیدن بر روی یا زیر پوست مربوط به کدام توهم است؟

- (۱) لمسی (tactile)
(۲) لی‌لی‌پوتی (Lilliputian)
(۳) جسمی (somatic)
(۴) چشایی (gustatory)

۷۳. کدام گزینه جزء برنامه آموزشی مدیریت استرس نیست؟

- (۱) مدیریت زمان
(۲) بارش ذهنی
(۳) خودنگری
(۴) حل مسئله

۷۴. احساس ترس ناشی از این باور است که فرد چاقو بخورد و زخمی شود. مربوط به کدام گزینه است؟

- (۱) حسی
(۲) هیجانی
(۳) رفتاری
(۴) فیزیولوژیک

۷۵. کدام گزینه زیر در مورد حسادت و سواسی درست نیست؟

- (۱) اشتغال غیر هذیانی به خیانت خیالی همسر مشخص می‌شود.
(۲) با اختلال روانی دیگر مانند اختلال هذیانی نوع حسادت قابل توجه نیست.
(۳) این حسادت‌ها اختلال قابل ملاحظه بالینی ایجاد نمی‌کند.
(۴) اشتغال‌های ذهنی ممکن است به رفتارها یا اعمال ذهنی تکراری در پاسخ به نگرانی‌های درباره خیانت منجر شوند.

۷۶. کدام گزینه زیر جزء مشکلات رفتاری محسوب می‌شود؟

- (۱) انتساب‌های منفی
(۲) احساسات ناموجه بیگانگی
(۳) خصومت به دیگری
(۴) اجتناب بدون حل و فصل مشکلات

فصل چهارم: سنجش و ارزیابی بالینی**۷۷. در کدام رویکرد رابطه مصاحبه‌گر - بیمار مصاحبه‌گر عموماً بر روند مصاحبه تسلط داد؟**

- (۱) مدل پدرمآبانه
(۲) مدل مشورتی
(۳) مدل آگاهی‌دهنده
(۴) مدل تفسیری

۷۸. پیشگیری ثانویه عبارت‌اند از:

- (۱) شناخت به‌موقع و درمان فوری یک اختلال یا بیماری
(۲) ممانعت از شروع یک بیماری
(۳) کاستن از شیوع آثار باقیمانده اختلال
(۴) کاهش دادن ناتوانی حاصل از اختلال

۷۹. روش‌های روان‌شناسی بالینی کدام است؟

- (۱) مصاحبه و ارزیابی شخصیت
(۲) مشاهده و گرفتن شرح حال
(۳) آزمون‌های روانی و مصاحبه بالینی
(۴) تاریخچه فردی، آزمون‌های تشخیصی و مصاحبه بالینی

۸۰. کدام یک جزء فوریت‌های روان‌پزشکی است؟

- (۱) گفتار آشفته
(۲) توهم‌های آمرانه
(۳) خطای ادراک
(۴) عقیده بیش بها داده شده

۸۱. تشخیصی افتراقی یعنی....

- (۱) بررسی روند اختلال
(۲) متمایز کردن از اختلالات نزدیک
(۳) سبب‌شناسی اختلال
(۴) بررسی از لحاظ جنسیتی

۸۲. کدام یک از گزینه‌های زیر جزء اختلالات درونی محسوب نمی‌شود؟

- (۱) مصرف مواد
(۲) اضطراب
(۳) افسردگی
(۴) جسمانی



۸۳. کدام گزینه جزء مشکلات عاطفی محسوب نمی‌شود؟
 (۱) نظارت
 (۲) خشم نسبت به طرف مقابل
 (۳) احساسات غمگینی
 (۴) بی‌تفاوتی
۸۴. در کدام رویکرد رابطه مصاحبه‌گر - بیمار مصاحبه‌گر از نظر بیمار سرد و غیر دلسوزانه جلوه می‌کند؟
 (۱) مدل آگاهی‌دهنده (۲) مدل تفسیری (۳) مدل پدرمآبانه (۴) مدل مشورتی
۸۵. «ناتوانی تفکیک واقعیت همراه با خلق واقعیتی جدید» کدام گزینه است؟
 (۱) واقعیت‌آزمایی (۲) واقع‌گریزی (۳) روان‌پریشی (۴) روان‌رنجوری
۸۶. مصاحبه‌گری در معاینه روانی از مراجع سؤال می‌کند آیا در فعالیت‌های روزانه یا رؤیاهای روزانه آن‌قدر مجذوب شوید که به آنچه در دنیای اطراف می‌گذرد بی‌توجه باشد مصاحبه‌گر کدام علامت را چک می‌کند؟
 (۱) مسخ شخصیت (۲) مسخ واقعیت (۳) حالت خلسه (۴) فلش بک
۸۷. در کدام نوع رویکرد مصاحبه‌گر - بیمار مصاحبه‌گر همچون یک دوست یا مشاور بیمار عمل می‌کند و علاوه بر ارائه اطلاعات، فعالانه از سیر اقدامات خاص دفاع می‌کند؟
 (۱) مدل آگاهی‌دهنده (۲) مدل تفسیری
 (۳) مدل مشورتی (۴) مدل پدرمآبانه
۸۸. کدام گزینه زیر صحیح نیست؟
 (۱) بینش مختل: کاهش قدرت فهم واقعیت عینی یک موقعیت
 (۲) بینش واقعی: فهم موقعیت‌های عینی موقعیت همراه با انگیزه و نیروی تسلط بر موقعیت
 (۳) بینش عقلانی: فهم واقعیت عینی یک سری موقعیت بدون توانایی انطباق آن به گونه‌ای مفید برای تسلط بر موقعیت
 (۴) بینش خودکار: کاهش قدرت فهم واقعیت عینی یک موقعیت
۸۹. در معاینه وضع روانی همه موارد زیر گزارش می‌شوند به جز؟
 (۱) ظاهر فرد (۲) رفتار و گفتار فرد
 (۳) الگوی خواب (۴) خلق و عواطف
۹۰. «توانایی ارزیابی درست یک موقعیت و اقدام متناسب در آن موقعیت» بیانگر کدام گزینه است؟
 (۱) بینش (۲) تفکر (۳) قضاوت (۴) حافظه
۹۱. در کدام رویکرد پزشک از مسئولیت تصمیمات درمانی طفره نمی‌رود اما روش انعطاف‌پذیری در پیش می‌گیرد و انتقادهای بیمار و روش‌های درمانی دیگر را نیز در نظر گرفته می‌شود؟
 (۱) مدل پدرمآبانه (۲) مدل آگاهی‌دهنده (۳) مدل تفسیری (۴) مدل مشورتی
۹۲. کدام گزینه جزء ۴ دیدگاه بهنجاری نیست؟
 (۱) بهنجاری به‌منزله فرآیند (۲) بهنجاری به‌منزله متوسط
 (۳) بهنجاری به‌منزله کمال مطلوب (۴) بهنجاری به‌منزل عادی بودن
۹۳. پزشکان از کدام رویکرد بهنجاری استفاده می‌کنند؟
 (۱) بهنجاری به‌منزله سلامت (۲) بهنجاری به‌منزله فرآیند
 (۳) بهنجاری به‌منزله متوسط (۴) بهنجاری به‌منزله کمال مطلوب
۹۴. کدام گزینه جزء مشکلات عاطفی محسوب نمی‌شود؟
 (۱) نظارت
 (۲) خشم نسبت به طرف مقابل
 (۳) احساسات غمگینی
 (۴) بی‌تفاوتی

۹۵. کدام گزینه زیر جزء سطوح بینشی (insight) نیست؟
(۱) بینش عقلانی (۲) بینش واقعی (۳) بینش مختل (۴) بینش انتقادی
۹۶. «تفکر تابع لفظ و صوت» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) تفکر انتزاعی (۲) تفکر عینی (۳) اختلال تفکر صوری (۴) تفکر اوتیستیک
۹۷. کدام رویکرد بهنجاری مشخصه روان‌کاوان است؟
(۱) بهنجاری به‌منزله سلامت (۲) بهنجاری به‌منزله کمال مطلوب (۳) بهنجاری به‌منزله متوسط (۴) بهنجاری به‌منزله فرآیند
۹۸. «توانایی بیمار برای فهم علت و مفهوم واقعی واقعیت» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) تفکر (۲) استدلال (۳) قضاوت (۴) بینش
۹۹. کدام گزینه زیر صحیح نیست؟
(۱) قضاوت خودکار: انجام رفلکسی یک عمل (۲) قضاوت عقلانی: فهم واقعیت عینی یک سری موقعیت (۳) قضاوت انتقادی: توانایی ارزیابی تشخیص و انتخاب بین امکانات مختلف در یک موقعیت (۴) قضاوت خودکار: انجام رفلکسی یک عمل
۱۰۰. کدام رویکرد بهنجاری در علوم اجتماعی و رفتاری استفاده می‌گردد؟
(۱) بهنجاری به‌منزله متوسط (۲) بهنجاری به‌منزله کمال مطلوب (۳) بهنجاری به‌منزله سلامت (۴) بهنجاری به‌منزله فرآیند
۱۰۱. امواج کند EEG در کدام دو اختلال شخصیت دیده می‌شود؟
(۱) اسکیزوتایپی-پارانویید (۲) ضداجتماعی-نمایشی (۳) ضداجتماعی-مرزی (۴) مرزی-نمایشی
۱۰۲. کدام گزینه در مورد سندرم خستگی مزمن صحیح نیست؟
(۱) وقتی خستگی بیش از ۱۲ ماه طول بکشد خستگی مزمن نامیده می‌شود (۲) خستگی شدید و ناتوان‌کننده غالباً همراه با درد عضلانی، سردرد، تب خفیف همراه است (۳) زنان حداقل ۲ بار بیشتر از مردان دچار می‌شوند (۴) ICD-10 این اختلال را یک بیماری با تعریف مبهم و علت نامشخص تحت عنوان خستگی و ضعف طبقه‌بندی کرده است
۱۰۳. بیماری به دلیل اختلال در بازداری به درمانگاه نوروسایکولوژی ارجاع می‌شود این نقص به دنبال ضایعات قشر..... ظاهر می‌شود.
(۱) گیجگاهی (۲) پیشانی (۳) آهیانه (۴) پس سری
۱۰۴. کدام گزینه جزء ۴ اصل اخلاقی در روان‌پزشکی و روان‌شناسی محسوب نمی‌شود؟
(۱) خودمختاری (۲) خیرخواهی (۳) عدالت (۴) سلامتی
۱۰۵. کدام مورد زیر با درجه‌بندی‌های رفتاری توسط معلمان در مورد دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مطابقت دارد؟
(۱) خطر بزهکاری (۲) مشکلات انگیزه‌ای (۳) مسائل ارتباط اجتماعی (۴) مشکلات رفتاری در کلاس
۱۰۶. کدام دارو در اختلال تیک استفاده می‌شود؟
(۱) لورازپام (۲) هالوپریدول (۳) لیتيوم (۴) کلومیپرامین



۱۰۷. کدام گزینه زیر در مرود ناخن جویدن صحیح نیست؟

- (۱) ناخن جویدن از ۵ سالگی شروع می‌شود.
- (۲) ناخن جویدن در پسرها فراوان‌تر از دخترها دیده می‌شود.
- (۳) ناخن جویدن در ۱۵-۱۰ سالگی به شدت خود می‌رسد.
- (۴) اکثر مبتلایان را کودکان ۹-۱۱ ساله تشکیل می‌دهند.

۱۰۸. کدام گزینه زیر در مورد ناخن جویدن صحیح نیست؟

- (۱) با رفع اضطراب و ناراحتی جویدن ناخن کلاً از بین می‌رود.
- (۲) جویدن ناخن نشانه دلواپسی، اضطراب و حرکتی برای تخلیه هیجان‌هاست.
- (۳) برای درمان این افراد به جای توجه به جویدن ناخن باید به شخص مبتلا توجه کرد.
- (۴) درمان اختلال فقط از طریق روان‌درمانی امکان‌پذیر است.

۱۰۹. کدام گزینه جزء شاه علامت ضعف اعصاب یا سندروم خستگی مزمن نیست؟

- (۱) خستگی‌پذیری
- (۲) کمبود آهن
- (۳) نگرانی درباره کارایی جسمانی و ذهنی است.
- (۴) ضعف

۱۱۰. کدام گزینه جزء دفاع‌های بالغ محسوب نمی‌شود؟

- (۱) پیش‌بینی (Anticipation)
- (۲) والایش (sublimation)
- (۳) ریاضت‌کشی (Asceticism)
- (۴) دلیل‌تراشی

۱۱۱. همه گزینه‌های زیر جزء دفاع‌های نورو تیک (روان‌نژندانه) محسوب می‌شود به جزء

- (۱) کنترل کردن
- (۲) بازداری
- (۳) جابجایی
- (۴) شوخ‌طبعی

۱۱۲. غنی‌ترین منبع فرضیه‌ها درباره علت و درمان ناهنجاری چیست؟

- (۱) آزمایش‌های عملی
- (۲) شرح‌حال‌های بالینی
- (۳) مشاهده
- (۴) همبستگی

۱۱۳. در درمان اختلال دوقطبی و فوبیای اجتماعی به ترتیب از کدام داروها بیشتر استفاده می‌شود؟

- (۱) لیتیوم-بازدارنده MAO
- (۲) فلوکستین-سرترالین
- (۳) لیتیوم-داروهای ضد اضطراب
- (۴) کلومیپرامین-باز دارنده MAO

۱۱۴. کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

- (۱) لالی انتخابی ممکن است وظیفه راهبرد جبرانی را برای کاهش برانگیختگی نگران‌کننده در روبرویی اجتماعی باشد.
- (۲) در موقعیت فوبیک ترس یا اضطراب تأخیری است.
- (۳) خطر خودکشی در افراد فوبی ۶۰ درصد است.
- (۴) اختلال اضطراب اجتماعی فقط عملکرد از موقعیت‌های اجتماعی غیر عملکردی نمی‌ترسند.

۱۱۵. کدام یک از مکانیسم‌های دفاعی زیر پخته‌تر محسوب می‌شود؟

- (۱) انکار
- (۲) جداسازی
- (۳) تجزیه
- (۴) برون‌سازی

۱۱۶. اولین قدم در تشخیص افتراقی اختلال هذیانی حذف تشخیص کدام دسته از اختلالات است؟

- (۱) دلیریوم
- (۲) اسکیزوفرنی
- (۳) بیماری‌های طبی
- (۴) دمانس

۱۱۷. در تمیز بین ترس و اضطراب کدام یک از گزینه‌های زیر تفاوت دارد؟

- (۱) شناختی
- (۲) رفتاری
- (۳) هیجانی
- (۴) بدنی

۱۱۸. کدام فرد افسردگی را متضمن ابراز پر خاشگری بر محبوب می‌داند؟

- (۱) ملانی کلاین
- (۲) بیبرینگ
- (۳) سیلوانو آریتی
- (۴) یاکوبسن

۱۱۹. آزمایش آمنیوسنتزیس در چه زمانی از بارداری انجام می‌گیرد؟

- (۱) هفته ۸-۱۰ (۲) هفته ۱۲-۱۴ (۳) هفته ۱۰-۱۲ (۴) هفته ۱۴-۱۶

۱۲۰. کدام گزینه زیر در مورد خودکشی در نوجوانان صحیح نیست؟

- (۱) در تمامی کشورها خودکشی در کودکان قبل از بلوغ شایع است.
(۲) خودکشی موفق در پسران نوجوان تقریباً ۵ بار بیشتر از دختران است.
(۳) رایج‌ترین روش خودکشی موفق در کودکان و نوجوانان اسلحه گرم است.
(۴) در افراد خودکشی سروتونین در قشر پیشانی مغز کاهش نشان می‌دهد.

فصل پنجم: علائم و نشانه‌ها در روان‌پزشکی

۱۲۱. «خلقی بشاش‌تر از طبیعی که الزاماً بیمارگون نیست» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) شنگولی euphoria (۲) وجد ecstasy

- (۳) خلق بالا elevated mood (۴) سرمستی exaltation

۱۲۲. «خطای حسی که در آن فکری تازه تکرار فکری که قبلاً تجربه یا احساس شده است تلقی می‌شود» بیانگر

کدام گزینه است؟

- (۱) déjà entendu (۲) confabulation

- (۳) déjà pense (۴) déjà vu

۱۲۳. آلگوفوبیا (algophobia) ترس از است

- (۱) گربه (۲) خون (۳) همه‌چیز (۴) درد

۱۲۴. «ناتوانی در داشتن تداعی‌های هدفداری در تفکر که در آن سخنگو هرگز از نقطه مبدأ به نقطه مطلوب

نمی‌رسد» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) تفکر مماسی (tangentiality) (۲) واژه‌سازی (neologism)

- (۳) سالاد کلمات (word salad) (۴) حاشیه پردازی (circumstantiality)

۱۲۵. «اصطلاح کلی برای هر وضعیت بی‌حرکتی که به طور مستمر حفظ می‌شود» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) کاتالپسی (catalepsy) (۲) تخلیه هیجانی (abreaction)

- (۳) بی‌حرکتی (akinesia) (۴) کاتاپلکسی (cataplexy)

۱۲۶. هذیان جزء کدام قسمت کار محسوب می‌شود؟

- (۱) محتوای فکر (۲) شکل فکر (۳) جریان فکر (۴) مالکیت فکر

۱۲۷. «قدرت مطلق یا همه کار توانی» از خصوصیات کدام نوع تفکر است؟

- (۱) فلسفی (۲) سحرآمیز (۳) توهم (۴) هذیان

۱۲۸. «تقلید بیمارگونه حرکات شخصی دیگر» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) آینه کرداری (echopraxia) (۲) آپراکسی (apraxia)

- (۳) اکولالیا (echolalia) (۴) پژواک گفتاری (Echolalia)

۱۲۹. «خطای حسی بازشناسی شنیداری» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) déjà entendu (۲) déjà vu

- (۳) déjà pense (۴) jamais vu



۱۳۰. «فقدان موقتی قوام عضلانی و سستی تسریع شده توسط تنوعی از حالات هیجانی» تعریف کدام گزینه است؟

(۱) بی‌حالی (adynamia) (۲) اکولالیا (ecolalia)

(۳) خستگی (fatigue) (۴) کاتاپلکسی (cataplexy)

۱۳۱. «ناتوانی هماهنگی عضلانی، بی‌نظمی در عملکرد عضله» بیانگر کدام گزینه است؟

(۱) کاتاپلکسی (cataplexy) (۲) کاتالپسی (catalepsy)

(۳) آپراکسی (apraxia) (۴) آتاکسی (ataxia)

۱۳۲. «تکرار بیمارگون کلمات یا عبارات یک شخص توسط شخص دیگر» بیانگر کدام گزینه است؟

(۱) اکولالیا (۲) پژواک کرداری

(۳) آتاکسی (۴) آپراکسی

۱۳۳. اختلال در وقوف به زمان، مکان و شخص کدام گزینه است؟

(۱) اغما (coma) (۲) فقدان جهت‌یابی (disorientation)

(۳) جهت (stupor) (۴) اختلال هوشیاری (consciousness)

۱۳۴. «اختلال در فرم تفکر تا محتوای آن» بیانگر کدام گزینه است؟

(۱) تفکر ذهنی (۲) تفکر غیرمنطقی

(۳) تفکر عینی (۴) اختلال تفکر صوری

۱۳۵. «عقاید غلط غیرمنطقی و ثابت که ثابت آن کمتر از تفکر هذیانی است» بیانگر کدام گزینه است؟

(۱) خطای ادراک (۲) افکار بیش بها داده‌شده

(۳) توهم (۴) هذیان

۱۳۶. «عقاید غلطی که بر استنتاج‌های غلط در خصوص واقعیت بیرونی استوار است» بیانگر کدام گزینه است؟

(۱) افکار بیش بها داده‌شده (۲) هذیان

(۳) توهم (۴) خطای ادراک

۱۳۷. فقدان واکنش به محیط و عدم آگاهی از آن تعریف کدام است؟

(۱) بهت (stupor)

(۲) ابر گرفتگی شعور (clouding of consciousness)

(۳) اغما (coma)

(۴) اغما با چشمان باز (coma vigil)

۱۳۸. «اختلال هوشیاری همراه با توهم» تعریف کدام است؟

(۱) دلیریوم (delirium) (۲) گم‌گشتگی (confusion)

(۳) حالت شفق (twilight state) (۴) خواب‌آلودگی (somnolence)

۱۳۹. تعریف کدام گزینه صحیح است؟

(۱) عاطفه سطحی: تغییر سریع و ناگهانی در حالت احساس هیجانی

(۲) اغما: درجات عمیق ناهوشیاری

(۳) سنگولی: احساس نشئه شدید

(۴) گم‌گشتگی: خواب‌آلودگی غیرعادی

۱۴۰. «توجه و تمرکز مفرط روی محرک‌های درونی و بیرونی» تعریف کدام است؟

(۱) توجه (attention) (۲) تلقین‌پذیری (suggestibility)

(۳) گوش‌به‌زنگ بودن (hyper vigilance) (۴) خلسه (trance)

۱۴۱. «انحراف تدریجی یا ناگهانی در رشته افکار بدون انسداد» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) خروج از خط
(۲) پاسخ نامربوط
(۳) شکل شدن تداعی‌ها
(۴) حاشیه پردازی
۱۴۲. «قطع ناگهانی در رشته افکار قبل از آنکه فکری به پایان برسد» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) پرش افکار (flight of ideas)
(۲) تفکر مماسی (tangentiality)
(۳) حاشیه پردازی (circumstantiality)
(۴) انسداد فکر (blocking)
۱۴۳. در کدام توهم اشیاء کوچک‌تر از اندازه واقعی درک می‌شوند؟
(۱) هالوسینوز
(۲) لی‌لی‌پوتی
(۳) لمسی
(۴) جسمی
۱۴۴. «پر کردن ناخودآگاه فواصل حافظه با تجارب غیرواقعی و خیالی که بیمار آنها را باور می‌کند اما واقعیت ندارد» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) افسانه‌سازی (confabulation)
(۲) فراموشی پیش‌گستر (anterograde)
(۳) آشناپنداری (deja vu)
(۴) فراموشی پس‌گستر (retrograde)
۱۴۵. «فعالیت بی‌منظور بدون هدفمندی» تعریف کدام است؟
(۱) کاتاتونیک
(۲) پرش افکار
(۳) حواس‌پرتی
(۴) سراسیمگی روانی-حرکتی
۱۴۶. فقدان توانایی محاسبه که ناشی از اضطراب یا اختلال تمرکز نیست همراه با نقایص عصبی و اختلال یادگیری در کدام گزینه زیر دیده می‌شود؟
(۱) محاسبه پرشی (acalculia)
(۲) آلکسیا (alexia)
(۳) آکولایا (aculalia)
(۴) آلکسی تایمی (alexithymia)
۱۴۷. «تجربیات ذهنی که بیمار توصیف می‌کند مانند خلق افسرده» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) علائم (signs)
(۲) سندروم (syndrome)
(۳) نشانه‌ها (symptoms)
(۴) نوروژ
۱۴۸. «به یافته‌های عینی و مشاهدات بالینگر اطلاق می‌شود مانند کندی روانی حرکتی» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) علائم (signs)
(۲) سایکوز (psyehosis)
(۳) سندروم (syndrome)
(۴) نشانه‌ها (symptoms)
۱۴۹. «سندرمی در افراد سالمند که معمولاً شب‌ها بروز می‌کند و مشخصه آن خواب‌آلودگی، اغتشاش شعور، آتاکسی و افتادن در نتیجه تأثیر رخوت زدایی داروهاست» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) غروب‌زدگی (sundowning)
(۲) دلیریوم (delirium)
(۳) اغتشاش شعور (confusion)
(۴) تیرگی هوشیاری (clouding of consciousness)
۱۵۰. «توجه متمرکز و هوشیاری تغییر یافته معمولاً در هیپنوتیزم، اختلالات تجزیه‌ای و تجارب خلسه‌ای مذهبی دیده می‌شود» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) خلسه (trance)
(۲) اغتشاش شعور (confusion)
(۳) گوش‌به‌زنگی (hypervigilance)
(۴) توجه (attention)



۱۵۱. «ابراز احساس بدون مهار که معمولاً همراه با برآورد، اغراقی درباره اهمیت و معنای احساسات است» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) خلق منبسط (expansive)
 (۲) خلق طبیعی (euthymic)
 (۳) خلق بالا (elevated)
 (۴) خلق تحریک‌پذیر (irritable)

۱۵۲. «ناتوانی یا اشکال در توصیف یا آگاهی شخص از هیجانات یا خلق خود» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) الکسی‌تایمی (alexithymia)
 (۲) هیجان (emotion)
 (۳) سرخوشی (elation)
 (۴) آتاکسی (ataxia)

۱۵۳. «تقلید حرکات یک شخص توسط شخص دیگر» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) اکوپراکسی (ecopraxia)
 (۲) کاتالپسی (catalepsy)
 (۳) اکولالیا (echolalia)
 (۴) کاتاپلکسی (cataplexy)

۱۵۴. «ناتوانی شخص نسبت به شناخت نقیصه عصب‌شناختی که برای او اتفاق افتاده است» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) آنوسوگنوزیا (anosognosia)
 (۲) ادراک پرشی همزمان (simultagnosia)
 (۳) سوماتو پاگنوزیا (somatopagnosia)
 (۴) آستروگنوزیا (astereognosis)

۱۵۵. «ناتوانی شخصی برای تشخیص قسمتی از بدن خود» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) پروسوپاگنوزیا (prosopagnosia)
 (۲) خطای حسی (illusion)
 (۳) سوماتو پاگنوزیا (somatopagnosia)
 (۴) ادراک پرشی بصری (visual agnosia)

۱۵۶. «ایجاد شدن یک حس به وسیله حس دیگر» تعریف کدام گزینه است؟

- (۱) سینستزیا (synesthesia)
 (۲) توهم جسمی (somatic hallucination)
 (۳) توهم لمسی (hallucination tactile)
 (۴) توهم بینایی (visual hallucination)

۱۵۷. «ناتوانی شناخت و تفسیر معنی تأثیرات حسی» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) ادراک پرشی (آگنوزی) (agnosia)
 (۲) آپراکسی (apraxia)
 (۳) آتاکسی (ataxia)
 (۴) کاتالپسی (catalepsy)

۱۵۸. فقدان آهنگ طبیعی گفتار..... است

- (۱) دیسفازی (۲) آفازی (۳) آفونی (۴) دیس پرسودی

۱۵۹. «ناتوانی شناخت اشیاء یا افراد» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) ادراک پرشی بصری (visual agnosia)
 (۲) ادراک پرشی لمسی (astereognosis)
 (۳) ادراک پرشی همزمان (simultagnosia)
 (۴) کنشی پرشی (آپراکسی) (apraxia)

۱۶۰. «اختلال عاطفه که با کاهش شدید در شدت حالت احساسی ابراز شده مشخص می‌شود» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) عاطفه کند (blunted affect)
 (۲) عاطفه سطحی (flat affect)
 (۳) عاطفه محدود (restricted affect)
 (۴) هیجان (emotion)

۱۶۱. «فقدان هر نشانه‌ای از تجلی عاطفی، صدا یکنواخت، چهره بی حرکت» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) عاطفه متراکم (constricted)
 (۲) عاطفه کند (blunted affect)
 (۳) عاطفه سطحی (flat affect)
 (۴) عاطفه بی‌ثبات (labile affect)

۱۶۲. اکولالیا (aculalia) در همه موارد زیر دیده می‌شود به جزء؟
(۱) مانیا
(۲) اختلال اضطراب فراگیر
(۳) اسکیزوفرنی
(۴) نقایص عصبی
۱۶۳. «..... القای منفعل حفظ کردن وزن بدن در برابر جاذبه است» کدام گزینه زیر جمله را تکمیل می‌کند؟
(۱) کاتالپسی
(۲) کاتاپلکسی
(۳) خشک‌زدگی
(۴) آلکسی تایمی
۱۶۴. «ناتوانی شناخت چهره‌ها» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) آگنوزی بصری ارتباطی Apperceptive visual Agnosia
(۲) آگنوزی بصری اندریافتی Apperceptive visual Agnosia
(۳) پروسوپاگنوزیا prosopagnosia
(۴) سندرم آنتون Anton syndrome
۱۶۵. «ناتوانی شناخت اشیاء با لمس» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) استرنو پاگنوزیا (astereognosis)
(۲) ادراک پرشی همزمان (simultagnosia)
(۳) ادراک پرشی (آگنوزی agnosia)
(۴) سندرم آنتون (anton syndrome)
۱۶۶. کدام یک جزء توهم هندسی محسوب نمی‌شود؟
(۱) تارهای عنکبوت
(۲) شبکه‌ها
(۳) دودکش
(۴) بوی ماهی فاسد
۱۶۷. القای منفصل وضع اندامی که در برابر نیروی جاذبه اختیار می‌شود مربوط به کدام گزینه است؟
(۱) بهت
(۲) جمود خلسه‌ای
(۳) رفتار قالبی
(۴) منفی‌گرایی
۱۶۸. «تقلید کردن از گفتار دیگران» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) پژواک‌گویی
(۲) شکلک
(۳) پژواک‌کرداری
(۴) رفتار قالبی
۱۶۹. بی‌اعتنایی، حتی مقاومت در برابر مستقر شدن توسط آزمایش‌دهنده تعریف.....
(۱) ادا و اطوار
(۲) سراسیمگی
(۳) انعطاف‌پذیری مومی شکل
(۴) منفی‌گرایی
۱۷۰. کدام گزینه زیر غلط است؟
(۱) آکروفوبی acrophobia: ترس از ارتفاع
(۲) آگورافوبی agoraphobia: ترس از مکان‌های باز
(۳) ایلوروفوبی (ailurophobia): ترس از گربه‌ها
(۴) کلاستروفوبی (claustrophobia): ترس از مکان‌های باز
۱۷۱. کدام گزینه زیر غلط است؟
(۱) زوئوفوبی (zoophobia): ترس از حیوانات
(۲) گزنوفوبی (xenophobia): ترس از سگ‌ها
(۳) میزوفوبی (mysophobia): ترس از آلودگی و میکروب‌ها
(۴) هیدروفوبی (hydrophobia): ترس از آب
۱۷۲. «احساس کاذب ناآشنایی با موقعیتی که شخص آن را قبلاً تجربه کرده است» بیانگر کدام گزینه است؟
(۱) jamais vu
(۲) deja entendu
(۳) deja vu
(۴) deja pense



۱۷۳. کدام گزینه جزء توهم‌های احشایی (cenesthetic) نیست؟
 (۱) احساس خزیدن حشرات روی پوست
 (۲) احساس بریدگی در مغز استخوان
 (۳) احساس فشار در عروق خونی
 (۴) احساس اعوجاج بدن
۱۷۴. در بیمار رشته کلام را گم می‌کند و هرگز به موضوع اول بر نمی‌گردد.
 (۱) انسداد فکر
 (۲) تفکر مماسی
 (۳) تفکر جادویی
 (۴) حاشیه پردازی
۱۷۵. «به هرگونه اختلال در فهم یا تولید کلام که بر اثر ضایعه‌ای مغزی ایجاد شده» بیانگر کدام گزینه است
 (۱) آتاکسی (۲) آفازی (۳) آپراکسی (۴) آفونی
۱۷۶. ناتوانی در شناسایی چهره‌های آشنا که ناشی از تخریب حدت بینایی یا کاهش سطح هوشیاری نیست؟
 (۱) پارسستی (paresthesia)
 (۲) ناآشنابینی (jamasis vu)
 (۳) پروسوپاگنوزیا (prosopagnosia)
 (۴) دیس‌پروسودی
۱۷۷. اریتروفوبیا (erythrophobia)
 (۱) ترس غیرطبیعی از گربه
 (۲) ترس غیرطبیعی از درد
 (۳) ترس غیرطبیعی از عدد ۱۳
 (۴) ترس غیرطبیعی از سرخ شدن چهره
۱۷۸. خروج از خط (derailment) در کدام اختلال زیر دیده می‌شود؟
 (۱) دوقطبی
 (۲) اسکیزوفرنی
 (۳) پانیک
 (۴) اختلالات تجزیه‌ای
۱۷۹. دوسوگرایی یا دودلی (ambivalence) در کدام گزینه دیده نمی‌شود؟
 (۱) اختلال وسواسی-جبری (OCD)
 (۲) اختلال وحشت‌زدگی
 (۳) حالات مرزی
 (۴) اسکیزوفرنی
۱۸۰. «ناتوانی در انجام فعالیت‌های حرکتی هدفمند ارادی» بیانگر کدام گزینه است؟
 (۱) کاتاپلکسی (۲) کاتالپسی (۳) آتاکسی (۴) آپراکسی
۱۸۱. «از بین رفتن ناگهانی قوام عضلات که بر اثر ضعف و عدم تحرک ایجاد می‌شود» بیانگر کدام گزینه است؟
 (۱) نارکولپسی (۲) آتاکسی (۳) کاتاپلکسی (۴) کاتالپسی
۱۸۲. «ناتوانی یا اشکال در توصیف یا آگاهی شخص از هیجان‌ات یا خلقیات خود» بیانگر کدام گزینه است؟
 (۱) دیس‌پروسودی (۲) کاتالپسی
 (۳) کاتاپلکسی (۴) آلکسی‌تایمی
۱۸۳. «عدم توانایی کپی کردن شکل‌هایی نظیر مکعب ساعت یا پنج‌ضلعی ناشی از یک ضایعه» بیانگر کدام گزینه است؟
 (۱) سندروم آنتون
 (۲) کردارپرشی ساختاری
 (۳) کردار پرشی
 (۴) آتاکسی
۱۸۴. «حالت احساس پیچیده حاوی مؤلفه‌های روانی جسمی و رفتاری» بیانگر کدام گزینه است؟
 (۱) هیجان (۲) رفتار (۳) خلق (۴) عاطفه
۱۸۵. «حالتی که در آن اشیاء بزرگ‌تر از اندازه واقعی خود دیده می‌شوند» بیانگر کدام گزینه است؟
 (۱) درشت بینی (macropsia)
 (۲) ریزبینی (micropsia)
 (۳) توهم بینایی (visual hallucination)
 (۴) توهم لمسی (tactile hallucination)

۱۸۶. «خطای حسی بازشناسی بینایی که در آن موقعیت جدید به اشتباه تکرار حافظه قبلی تلقی می‌شود» بیانگر کدام گزینه است؟

- (۱) آمنزیا
(۲) آگنوزی
(۳) آشناپنداری (deja vu)
(۴) آشناپنداری فکر نو (deja pense)

فصل ششم: دیدگاه‌های نظری درباره اختلالات روانی و روش‌های درمانی آنها

۱۸۷. کدام نظریه‌پرداز در مورد «فضای زندگی» صحبت کرده است؟

- (۱) کورت لوین
(۲) ژاک لاکان
(۳) آبراهام مازلو
(۴) هاینز کوهوت

۱۸۸. کدام مرحله اریکسون سرنوشت‌سازترین مرحله است؟

- (۱) سخت‌کوشی در مقابل احساس حقارت
(۲) صمیمیت در مقابل انزوا
(۳) خودمختاری در مقابل شرم و تردید
(۴) ابتکار در مقابل احساس گناه

۱۸۹. کدام روانشناس زیر مطرح کرد که «کودک پدر انسان است»؟

- (۱) اریکسون
(۲) فروید
(۳) وردزورت
(۴) آدلر

۱۹۰. از نظر روان‌پویشی علت الکلیسم چیست؟

- (۱) شخصیت دهانی
(۲) نهفتگی
(۳) تثبیت مقعدی
(۴) تثبیت ادیبی

۱۹۱. کدام گزینه زیر جزء دفاع‌های ناپخته نیست؟

- (۱) انسداد (Blocking)
(۲) برون‌سازی (externalization)
(۳) کنش‌نمایی (acting out)
(۴) درون‌فکنی (introjection)

۱۹۲. مدل «درماندگی آموخته شده» در تبیین افسردگی به کدام مدل منتفی گردید؟

- (۱) طرحواره‌ای افسردگی‌زا
(۲) خشم درون‌ریز شده
(۳) تقویت اجتماعی
(۴) اسناد علی درونی

۱۹۳. کدام مکانیسم در فوبیا مطرح است؟

- (۱) جابه‌جایی
(۲) تجزیه
(۳) فرافکنی
(۴) سرکوب

۱۹۴. علت مجاور افسردگی کدام است؟

- (۱) مشکل در تصمیم‌گیری
(۲) ناامیدی
(۳) کندی روانی-حرکتی
(۴) فلج اراده

۱۹۵. مؤلفه شناختی اضطراب کدام است؟

- (۱) وحشت‌زدگی
(۲) انتظار خطری واضح
(۳) انتظار خطری مبهم
(۴) احساس دلشوره

۱۹۶. بر اساس کدام دیدگاه خانواده‌واجد بیماری اسکیزوفرنی است نه فرد بیمار؟

- (۱) دیالکتیکی
(۲) روان‌تحلیلی
(۳) پدیدارشناختی
(۴) رفتارگرایی



۱۹۷. کدام گزینه جزء دفاع‌های خودشیفته محسوب می‌شود؟

- (۱) انکار-فرافکنی-تعریف
 (۲) انکار-کنش‌نمایی-درون‌فکنی
 (۳) فرافکنی-جابه‌جایی-واکنشی وارونه
 (۴) تحریف-دلیل‌تراشی-جداسازی

۱۹۸. کدام یک از گزینه‌های زیر جزء اختلالات بیرونی محسوب نمی‌شود؟

- (۱) اختلال لجبازی و نافرمانی
 (۲) سلوک
 (۳) مصرف مواد
 (۴) جسمانی

۱۹۹. کدام گزینه جزء مشکلات شناختی محسوب می‌شود؟

- (۱) بلاگردان کردن او
 (۲) احساسات غمگینی
 (۳) جروبخت
 (۴) بی‌تفاوتی

۲۰۰. خودکشی در کدام گروه سنی از همه بیشتر شیوع دارد؟

- (۱) در افراد ۲۰-۳۰ ساله بالاترین شیوع دارد.
 (۲) در افراد ۳۰-۴۰ ساله بیشترین شیوع دارد.
 (۳) در افراد ۴۰-۵۰ ساله بیشترین شیوع دارد.
 (۴) میزان خودکشی در بالای سن ۶۵ سالگی به بالاترین حد خود می‌رسد.

۲۰۱. سازوکار دفاعی خیال‌پردازی در کدام اختلال شخصیت بیشتر مطرح است؟

- (۱) خودشیفته
 (۲) مرزی
 (۳) پارانویید
 (۴) اسکیزوئید

۲۰۲. تعریف زیر کدام روش درمان را نشان می‌دهد؟

«فرد مکرراً با محرکی مواجه می‌شود که از آن می‌ترسد و برای درمان PTSD به کار می‌رود»

- (۱) درمان اجتنابی
 (۲) مواجهه‌سازی ممتد
 (۳) غرقه‌سازی
 (۴) حساسیت‌زدایی منظم

۲۰۳. اگر درمانگری به دنبال نشان دادن رفتار مطلوب از جانب کودک اقدام به حذف محرک نامطبوع نماید از چه

شیوه‌های استفاده کرده است؟

- (۱) خاموشی
 (۲) تقویت منفی
 (۳) تقویت مثبت
 (۴) تنبیه

۲۰۴. مهم‌ترین عامل اختلالات روانی بر اساس نظریه تحلیلی‌گری کدام است؟

- (۱) غریزه پرخاشگری
 (۲) غریزه جنسی
 (۳) اضطراب
 (۴) غریزه مرگ

۲۰۵. اصلاح زره‌منش را اولین بار کدام دانشمند و به چه منظور استفاده کرد؟

- (۱) فروید-سبک‌های دفاعی
 (۲) رایش-سبک‌های دفاعی
 (۳) رایش-تکانه‌ها
 (۴) فروید-تکانه

۲۰۶. صفات منظم بودن، خست و لجاجت مربوط به کدام یک از مراحل رشد جنسی فروید است؟

- (۱) آلتی
 (۲) تناسلی
 (۳) دهانی
 (۴) مقعدی

۲۰۷. کدام‌یک از مفروضه‌های رفتارگرایی محسوب نمی‌شود؟

- (۱) آزمایشگری
 (۲) ایجاد تغییر در رفتار
 (۳) محیط‌گرایی
 (۴) ذهن‌گرایی

۲۰۸. همه گزینه‌های زیر شامل دفاع‌های نوروپیک است به جز...؟

- (۱) جنسی‌سازی-واپس زنی
 (۲) واکنشی وارونه-تجزیه
 (۳) تخیل اسکیزوئید-جسمانی سازی
 (۴) جداسازی-عقلانی سازی

۲۰۹. همه گزینه‌های زیر جزء مشکلات رفتاری در رابطه والد-فرزند محسوب می‌شود به جز؟

- (۱) کنترل ناکافی والد
(۲) فشار بیش‌ازاندازه والد
(۳) محافظت بیش‌ازحد والد
(۴) بی‌تفاوتی

۲۱۰. کدام گزینه جزء ۴ علت شایع مرگ در افراد سنین ۲۴-۱۰ ساله نیست؟

- (۱) تصادفات رانندگی
(۲) اعتیاد
(۳) قتل
(۴) خودکشی

۲۱۱. کدام یک ویژگی شخصیت تیپ A نیست؟

- (۱) احساس فوریت زمان
(۲) خونسردی
(۳) پرخاشگری و خصومت
(۴) رقابت‌طلبی

فصل هفتم: اختلالات عصبی-رشدی

۲۱۲. احتمال وجود چاقی در کدام اختلال زیر بیش‌تر است؟

- (۱) ADHD
(۲) اوتیسم
(۳) ODD
(۴) لکنت زبان

۲۱۳. همه گزینه‌های زیر با نشانه‌های بی‌توجهی ارتباط دارد به جز؟

- (۱) کمبودهای تحصیلی
(۲) بی‌توجهی همسالان
(۳) مشکلات مرتبط با مدرسه
(۴) طرد همسالان

۲۱۴. ۲ اختلال زبان در DSM-5 در کدام طبقه تشخیصی قرار می‌گیرد؟

- (۱) اختلالات ارتباط
(۲) اختلالات طیف اوتیسم
(۳) اختلالات یادگیری خاص
(۴) اختلال حرکتی

۲۱۵. «اختلالات ارتباط اجتماعی و الگوهای رفتار محدود، مکرر» مربوط به کدام ویژگی است؟

- (۱) طیف اوتیسم
(۲) اختلال زبان
(۳) اختلال ارتباط اجتماعی (عملی)
(۴) اختلال هماهنگی مربوط به رشد

۲۱۶. اختلال فصاحت با شروع کودکی (لکنت زبان) در DSM-5 در کدام طبقه تشخیصی قرار می‌گیرد؟

- (۱) اختلال زبان
(۲) ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی)
(۳) اختلالات ارتباط
(۴) اختلالات اضطرابی

۲۱۷. اختلال ارتباط اجتماعی (عملی) در DSM-5 در کدام طبقه تشخیصی قرار می‌گیرد؟

- (۱) اختلالات اضطرابی
(۲) اختلال حرکتی
(۳) اختلالات ارتباط
(۴) اختلالات افسردگی

۲۱۸. ناتوانی عقلانی نامشخص برای چه سنی مطرح است؟

- (۱) بالای ۴ سال
(۲) بالای ۶ سال
(۳) بالای ۵ سال
(۴) بالای ۷ سال

۲۱۹. کدام گزینه زیر در مورد اختلال حرکت قالبی صحیح نیست؟

- (۱) حرکات قالبی پیچیده خیلی کمتر شایع است.
(۲) انزوای اجتماعی عامل خطری برای تحریک خود است.
(۳) شروع در دوره رشد اولیه است
(۴) جزء اختلالات اخلاک‌گر کنترل تکانه و سلوک است.



۲۲۰. «جنبش حرکتی یا آواگرایی سریع عودکننده و ناموزون» مربوط به کدام اختلال است؟

- (۱) اختلالات تیک
(۲) اختلال حرکت قالبی
(۳) اختلال هماهنگی مربوط به رشد
(۴) کردار پریشی

۲۲۱. «مشکلاتی در رابطه با پیروی کردن از قواعد برای گفتگو یا داستان‌سرایی، نظیر رعایت نوبت در گفتگو» مربوط به کدام اختلال زیر است؟

- (۱) ADHD
(۲) اختلال صدای گفتار
(۳) اختلال ارتباط اجتماعی (عملی)
(۴) اختلال زبان
۲۲۲. در سیر بالینی اختلال بیش‌فعالی و کم‌توجهی ابتدا کدام نشانه فروکش می‌کند؟

- (۱) پرتحرکی
(۲) خلق‌وخو
(۳) تکانشگری
(۴) حواس‌پرتی

۲۲۳. کدام گزینه در مورد تشخیص اسپرگر در DSM-5 صحیح است؟

- (۱) تشخیص طیف اوتیسم در مورد آن استفاده می‌شود.
(۲) با اختلال رت آمیخته شده است.
(۳) از طبقه‌بندی تشخیصی حذف شده است.
(۴) به‌عنوان اختلال عقلانی-رشدی در نظر گرفته می‌شود.

۲۲۴. مدت زمان اختلال تیک موقتی چه مدت است؟

- (۱) کمتر از ۱۲ ماه
(۲) کمتر از ۶ ماه
(۳) کمتر از ۳ ماه
(۴) کمتر از ۱ ماه

۲۲۵. اگر فردی معیارهای اختلال ADHD و اختلال بی‌نظمی خلق‌اخلالگر داشته باشد کدام تشخیص در مورد او مطرح است؟

- (۱) هردو تشخیص
(۲) ADHD
(۳) اختلال بی‌نظمی خلق‌اخلالگر
(۴) اختلال انفجاری متفاوت

۲۲۶. کدام گزینه در مورد اختلال ADHD صحیح نیست؟

- (۱) نیمی از کودکانی که جلوه مختلط دارند اختلال لجبازی و نافرمانی دارند.
(۲) یک‌چهارم کودکانی که جلوه بی‌توجهی دارند اختلال لجبازی و نافرمانی دارند.
(۳) یک‌چهارم کودکان یا نوجوانانی که جلوه مختلط دارند به طور همزمان اختلال سلوک دارند.
(۴) ADHD در طبقه اختلال‌اخلالگر کنترل‌تکانه و سلوک قرار می‌گیرد.

۲۲۷. کدام گزینه زیر عوامل خطر اختلال یادگیری خاصی نیست؟

- (۱) زودرسی
(۲) وزن کم به هنگام تولد
(۳) وزن زیاد به هنگام تولد
(۴) قرار گرفتن پیش از تولد در معرض نیکوتین

۲۲۸. کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

- (۱) ویژگی اولیه اختلال طیف اوتیسم توجه مشترک معیوب است.
(۲) مشکل هماهنگ کردن ارتباط غیرکلامی با گفتار ممکن است برداشت زبان بدن عجیب‌وغریب و بی‌روح ایجاد کند.
(۳) بزرگسالان مبتلا به اوتیسم ساعت زیادی را صرف نوشتن برنامه‌های زمانی می‌کنند.
(۴) شیوع طیف اوتیسم در نمونه‌های کودک و بزرگسال متفاوت است.

۲۲۹. کدام گزینه جزء عوامل غیراختصاصی اوتیسم نیست؟

- (۱) منزیت
(۲) مواجهه جنینی با والپوریت
(۳) سن بالای مادر
(۴) وزن کم به هنگام تولد

۲۳۰. کدام گزینه زیر در مورد اوتیسم صحیح نیست؟

- (۱) توارث‌پذیری اختلال طیف اوتیسم بر اساس میزان دوقلوئی بین ۳۷ درصد تا ۹۰ درصد است.
 - (۲) جافتاده‌ترین عوامل تشخیص برای اوتیسم مشکلات جهت‌یابی است.
 - (۳) این اختلال در پسرها ۴ برابر دخترها تشخیص داده می‌شود
 - (۴) ۱۵ درصد اوتیسم با جهش ژنتیکی ارتباط دارد.
- ۲۳۱. در صورتی که فرد در ارتباط اجتماعی و تعامل‌های اجتماعی اختلال نشان دهد اما رفتار یا تمایلات محدود و مکرر نشان ندهد کدام شخصیت مطرح است؟**

- (۱) اختلال طیف اوتیسم
- (۲) اختلال ارتباط اجتماعی (عملی)
- (۳) اسکیزوئید
- (۴) شخصیت ضداجتماعی

۲۳۲. کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

- (۱) نابهنجاری توجه و بیش‌فعالی در اوتیسم شایع است.
 - (۲) اسکیزوفرنی کودکی هیچ دوره عملکرد عادی نداشته است.
 - (۳) ۷۰ درصد افراد مبتلا به اوتیسم یک اختلال روانی همزمان دارند.
 - (۴) اختلال مصرف غذای اجتنابی-محدودکننده ویژگی بیانگر نسبتاً رایج طیف اوتیسم است.
- ۲۳۳. اگر فردی در چیدن پازل‌ها ساختن مدل‌ها و دستخط مشکل داشته باشد کدام تشخیص در مورد او مطرح است؟**

- (۱) اختلال هماهنگی مربوط به شد
 - (۲) اختلال حرکت قالبی
 - (۳) اختلال یادگیری خاص
 - (۴) اختلال یادگیری خاص
- ۲۳۴. اگر فردی معیارهای اختلال هماهنگی مربوط به رشد و اختلال طیف اوتیسم داشته باشد کدام تشخیص در مورد او مطرح است؟**

- (۱) بستگی به جنسیت فرد دارد
- (۲) اختلال طیف اوتیسم و اختلال هماهنگی مربوط به رشد
- (۳) اختلال هماهنگی مربوط به رشد
- (۴) اختلال طیف اوتیسم

۲۳۵. رفتار حرکتی تکراری ظاهراً برانگیخته شده و به ظاهر و بی‌هدف مربوط به کدام اختلال است؟

- (۱) اختلال حرکت قالبی
- (۲) اختلال هماهنگی مربوط به رشد
- (۳) اختلالات تیک
- (۴) سندروم پاهای بی‌قرار

۲۳۶. کدام گزینه زیر در مورد اختلال تیک صحیح نیست؟

- (۱) تیک‌ها با اضطراب، برانگیختگی و خستگی بدتر می‌شوند.
- (۲) اختلال توره از ۳ تا ۸ نفر در ۱۰۰۰ کودک دبستانی گسترش دارد.
- (۳) شروع اختلال بعد از ۱۸ سالگی است.
- (۴) پسرها بین ۴-۲ برابر دخترها مبتلا می‌شوند

۲۳۷. کدام گزینه در مورد ADHD درست نیست؟

- (۱) طرد همسالان و صدمه تصادف با نشانه‌های تکانشگری رابطه دارد
- (۲) مواجهه با مواد سمی محیطی با ADHD آینده همبستگی دارد
- (۳) وزن خیلی کم به هنگام تولد خطر ADHD را ۲ یا ۳ برابر می‌کند
- (۴) اگر نشانه‌های بی‌توجهی و بیش‌فعالی در دوره روان‌پریشی روی دهد ADHD تشخیص داده می‌شود

۲۳۸. در کدام گزینه زیر فرد اختلال ژنتیکی شناخته‌شده ندارد؟

- (۱) نشانگان رت
(۲) صرع
(۳) نشانگان X شکننده
(۴) نشانگان داون

۲۳۹. چند درصد اختلال اوتیسم با جهش ژنتیکی شناخته‌شده ارتباط دارد؟

- (۱) ۱۵ درصد
(۲) ۱۴ درصد
(۳) ۱۳ درصد
(۴) ۱۶ درصد

۲۴۰. در کدام اختلال زیر افراد در استفاده از مهارت‌های ارتباط کلامی و غیرکلامی برای رساندن منظور خود به

دیگران نقص‌هایی دارند؟

- (۱) اختلال فصاحت با شروع کودکی
(۲) اختلال زبان
(۳) اختلال ارتباط اجتماعی (عملی)
(۴) اوتیسم
۲۴۱. در مبتلایان به سندروم X شکننده کدام اختلال زیر بیشتر دیده می‌شود؟

- (۱) ADHD
(۲) OCD
(۳) GAD
(۴) Odd

۲۴۲. در DSM-5 اختلال طیف اوتیسم شامل همه گزینه‌های زیر است به جز؟

- (۱) اوتیسم
(۲) ADHD
(۳) اسپرگر
(۴) اختلال تجزیه کودکی

۲۴۳. کدام گزینه در مورد اختلال ADHD صحیح نیست؟

- (۱) حداقل معیارها برای بزرگسالان ۶ معیار است.
(۲) در DSM-IV-R نشانه‌ها قبل از ۷ سالگی بود.
(۳) در DSM-5 شروع نشانه‌ها قبل از ۱۲ سالگی است.
(۴) حداقل معیارها برای کودکان ۶ معیار است.
۲۴۴. کدام گزینه جزء حرکت قالبی نیست؟

- (۱) سرکوبش
(۲) گاز گرفتن خود
(۳) تکان دادن بدن
(۴) پلک زدن

۲۴۵. کدام گزینه در مورد همزمانی اختلال یادگیری خاص مطرح نیست؟

- (۱) ADHD
(۲) دوقطبی
(۳) اختلال هماهنگی مربوط به رشد
(۴) PTSD

۲۴۶. کدام گزینه جزء اختلال یادگیری خاص نیست؟

- (۱) اختلال در خواندن
(۲) اختلال در ریاضیات
(۳) اختلال در بیان نوشتاری
(۴) اختلال در فیزیک

۲۴۷. کدام گزینه جزء طبقه‌بندی ADHD در DSM-5 نیست؟

- (۱) جلوه مرکب
(۲) جلوه بیش فعال-تکانشی
(۳) جلوه بی‌قرار
(۴) جلوه بی‌توجهی

۲۴۸. کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) زودرسی، وزن کم و نیکوتین خطر اختلال یادگیری خاص را افزایش می‌دهد
(۲) منبع اطلاعات خاص برای تشخیص اختلال یادگیری خاص مطرح است
(۳) کمبودهای شناختی در اختلال خواندن اثبات نشده است
(۴) مشکلات یادگیری گذرا هستند

۲۴۹. در بزرگسالان مشکلاتی در استفاده از ابزارها، ناتوانی در یادداشت‌برداری و نوشتن سریع با کدام اختلال ارتباط دارد؟

- (۱) نشانگان بیش تحرکی مفصل
(۲) اختلال بیان نوشتاری
(۳) اختلال خواندن
(۴) اختلال هماهنگی مربوط به رشد

۲۵۰. در کودکان مشکلاتی در رابطه با نگاه‌داشتن چاقو و چنگال، بستن دکمه‌های لباس یا توپ بازی مربوط به کدام اختلال زیر است؟

- (۱) اوتیسم
(۲) اختلال هماهنگی مربوط به رشد
(۳) اختلال حرکت قالبی
(۴) ناتوانی عقلانی

۲۵۱. اگر فردی ملاک‌های اختلال هماهنگی مربوط به رشد و اوتیسم داشته باشد کدام تشخیص در مورد او مطرح است؟

- (۱) اختلال هماهنگی مربوط به رشد و اوتیسم
(۲) اوتیسم
(۳) اختلال هماهنگی مربوط به رشد
(۴) ADHD

۲۵۲. در کدام اختلال زیر خزانه رفتارها متغیر است، هر فردی رفتار الگو، امضای خاص خودش را نشان می‌دهد؟

- (۱) ADHD
(۲) اختلال حرکت قالبی
(۳) اختلال هماهنگی مربوط به رشد
(۴) اوتیسم

۲۵۳. کدام گزینه در مورد حرکات قالبی درست نیست؟

- (۱) انزوای اجتماعی عامل خطری برای تحریک خود است
(۲) حرکات قالبی ممکن است روزی چند بار روی دهد و از چند ثانیه تا چند دقیقه یا بیشتر ادامه دارد
(۳) حرکات قالبی پیچیده رایج است
(۴) رفتارهای قالبی می‌توانند از بیماری جسمانی دردناک ناشی شود

۲۵۴. اگر فردی ملاک‌های اختلال حرکت قالبی و نشانگان لش-نیهان داشته باشد کدام تشخیص در مورد او مطرح است؟

- (۱) اختلال حرکت قالبی و نشانگان لش-نیهان
(۲) اختلال حرکت قالبی
(۳) اختلال هماهنگی مربوط به رشد
(۴) نشانگان لش-نیهان

۲۵۵. کدام گزینه در مورد تیک غلط است؟

- (۱) تیک‌ها با اضطراب، برانگیختگی و خستگی بدتر می‌شوند
(۲) شروع تیک‌ها در بزرگسالان نادر است و اغلب با مصرف مواد ارتباط دارد
(۳) زنان مبتلا به تیک به احتمال بیشتری دچار اضطراب و افسردگی می‌شوند
(۴) درصد زیادی از افراد در بزرگسالی نشانه‌های شدید یا بدتر خواهند داشت
۲۵۶. مصرف بیش‌ازاندازه کدام ماده مخدر باعث اختلال تیک می‌شود؟

- (۱) کوکائین
(۲) توهم‌زها
(۳) حشیش
(۴) شیشه

۲۵۷. اختلال حرکت قالبی ظرف.....زندگی شروع می‌شود.

- (۱) ۴ سال اول
(۲) ۳ سال اول
(۳) ۵ سال اول
(۴) ۶ سال اول

۲۵۸. در ADHD کودکی و بزرگسالی به ترتیب فرد باید حداقل چند تا از ملاک‌های تشخیصی را داشته باشد؟

- (۱) ۵ و ۶
(۲) ۶ و ۶
(۳) ۵ و ۵
(۴) ۵ و ۵



۲۵۹. شیوع اختلال ناتوانی عقلانی در کل جمعیت، شیوع اختلال ناتوانی عقلانی شدید و نسبت جنسی آن به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است.

- ۱(۱) درصد - ۶ در ۱۰۰۰ - مردان بیشتر از زنان
 ۲(۲) درصد - ۶ در ۱۰۰۰ - زنان بیشتر از مردان
 ۳(۳) درصد - ۸ در ۱۰۰۰ - مردان بیشتر از زنان
 ۴(۴) درصد - ۸ در ۱۰۰۰ - زنان بیشتر از مردان

۲۶۰. اوج شیوع اختلال فصاحت با شروع کودکی چند سالگی است؟

- ۱(۱) ۲ سالگی
 ۲(۲) ۷ سالگی
 ۳(۳) ۶ سالگی
 ۴(۴) ۵ سالگی
 ۲۶۱. حداقل سنی تشخیص برای اختلال ارتباط اجتماعی (عملی) چند سالگی است؟
 ۱(۱) ۴ سالگی
 ۲(۲) ۵ سالگی
 ۳(۳) ۳ سالگی
 ۴(۴) ۷ سالگی

۲۶۲. شیوع اختلال طیف اوتیسم در کودکان چقدر است معمولاً نشانه‌ها در چه سنی تشخیص داده می‌شوند؟

- ۱(۱) درصد - ۲-۱ سالگی
 ۲(۲) درصد - ۴-۲ سالگی
 ۳(۳) درصد - ۲-۱ سالگی
 ۴(۴) درصد - ۴-۲ سالگی

۲۶۳. بی‌نظمی تعامل اجتماعی در نشانگان رت معمولاً در مشاهده می‌شود.

- ۱(۱) ۱ تا ۳ سالگی
 ۲(۲) ۱ تا ۴ سالگی
 ۳(۳) ۲ تا ۴ سالگی
 ۴(۴) ۳ تا ۵ سالگی

۲۶۴. سن تشخیص برای ADHD کودکی و بزرگسالی به ترتیب چند سالگی است؟

- ۱(۱) ۱۲ سالگی - ۱۷ سالگی
 ۲(۲) ۷ سالگی - ۱۸ سالگی
 ۳(۳) ۷ سالگی - ۱۷ سالگی
 ۴(۴) ۱۲ سالگی - ۱۸ سالگی

۲۶۵. نسبت جنسی ADHD کودکان در پسرها نسبت به دخترها چقدر است و دخترها بیشتر کدام نوع ADHD را نشان می‌دهند؟

- ۱(۱) برابر - جلوه مرکب
 ۲(۲) برابر - بی‌توجهی
 ۳(۳) برابر - جلوه مرکب
 ۴(۴) برابر - بی‌توجهی

۲۶۶. شیوع اختلال یادگیری در کودکان و بزرگسالان به ترتیب چقدر است؟

- ۱(۱) ۵ تا ۱۵ درصد - ۴ درصد
 ۲(۲) ۵ تا ۱۵ درصد - ۵ درصد
 ۳(۳) ۵ تا ۱۰ درصد - ۴ درصد
 ۴(۴) ۵ تا ۱۰ درصد - ۵ درصد

۲۶۷. اختلال صدای گفتار در DSM-5 در کدام طبقه تشخیصی قرار می‌گیرد؟

- ۱(۱) اختلالات اضطرابی
 ۲(۲) ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی)
 ۳(۳) اختلالات ارتباط
 ۴(۴) اختلال حرکتی

۲۶۸. اختلال یادگیری خاص در بیشتر است و نسبت آن است.

- ۱(۱) مردان - بین ۲ تا ۳
 ۲(۲) زنان - بین ۲ تا ۳
 ۳(۳) مردان - بین ۳ تا ۴
 ۴(۴) زنان - بین ۳ تا ۴

۲۶۹. شیوع اختلال هماهنگی مربوط به رشد در کودکان ۱۱-۵ ساله است و نسبت جنسی پسرها به دخترها است.

- ۱(۱) ۱/۸ تا ۳ درصد - ۸ تا ۹ برابر
 ۲(۲) ۱/۸ تا ۳ درصد - ۲ تا ۷ برابر
 ۳(۳) ۵ تا ۶ درصد - ۸ تا ۹ برابر
 ۴(۴) ۵ تا ۶ درصد - ۲ تا ۷ برابر

۲۷۰. کدام گزینه در مورد تشخیص افتراقی اختلال حرکت قالبی از اختلالات تیک درست نیست؟

- ۱(۱) حرکات قالبی در سن پایین‌تر (قبل از ۳ سالگی) شروع می‌شود ولی تیک‌ها بین ۷-۵ سالگی شروع می‌شوند
 ۲(۲) حرکات قالبی می‌توانند بازوها، دست‌ها یا کل بدن را در برگیرند
 ۳(۳) تیک‌ها معمولاً چشم‌ها، صورت، سر و شانه‌ها را شامل می‌شوند

۴) حرکات قالبی کوتاه‌مدت، سریع ولی تیک‌ها طولانی‌تر و ثابت‌تر هستند

۲۷۱. کدام یک جزء تیک‌های آوایی ساده محسوب نمی‌شود؟

- (۱) صاف کردن گلو
(۲) خرخر کردن
(۳) فین فین کردن
(۴) کشیدن دست‌وپا

۲۷۲. اوج شدت تیک‌ها.....است و در.....شدت آن‌ها کاهش می‌یابد.

- (۱) ۸ تا ۱۰ سالگی - جوانی
(۲) ۱۰ تا ۱۲ سالگی - جوانی
(۳) ۱۰ تا ۱۲ سالگی - نوجوانی
(۴) ۸ تا ۱۰ سالگی - نوجوانی

۲۷۳. کدام گزینه زیر در مورد اختلال توره صحیح نیست؟

- (۱) شیوع اختلال توره ۳ تا ۸ نفر در ۱۰۰ است
(۲) پسرها بیشتر از دخترها مبتلا می‌شوند (۴-۲ برابر)
(۳) شروع تیک‌ها معمولاً بین ۴ تا ۶ سالگی است
(۴) جزء اختلالات عصبی-رشدی محسوب می‌شود

۲۷۴. علائم یادگیری خاص حداقل چه مدت باید تداوم داشته باشد؟

- (۱) ۱۲ ماه
(۲) ۶ ماه
(۳) ۳ ماه
(۴) ۲ ماه

۲۷۵. در سیر بالینی اختلال بیش‌فعالی و کم‌توجهی کدام نشانه معمولاً تداوم دارد؟

- (۱) بیش‌فعالی
(۲) کم‌توجهی
(۳) خلق‌وخو
(۴) تکانشگری

۲۷۶. اگر فردی ملاک‌های اختلال هماهنگی مربوط به رشد و ADHD داشته باشد کدام تشخیص در مورد او مطرح است؟

- (۱) ADHD
(۲) اختلال هماهنگی مربوط به رشد و ADHD
(۳) اختلالات ارتباط
(۴) اختلال هماهنگی مربوط به رشد

۲۷۷. در صورتی که نشانه‌های اختلال بی‌نظمی خلق‌اخلالگر در زمینه اختلال طیف اوتیسم روی دهد کدام تشخیص به ترتیب در مورد وی مطرح است؟

- (۱) طیف اوتیسم
(۲) اختلال بی‌نظمی خلق‌اخلالگر
(۳) طیف اوتیسم - اختلال بی‌نظمی خلق‌اخلالگر
(۴) اختلال هماهنگی مربوط به رشد

۲۷۸. سندرم گرشتمن به کدام اختلال مربوط می‌شود؟

- (۱) اختلال خواندن
(۲) اختلال بیان نوشتاری
(۳) اختلال ریاضیات
(۴) اختلال واج‌شناسی

۲۷۹. کدام گزینه جزء ملاک‌های تشخیص اختلال یادگیری خاص نیست؟

- (۱) مشکل درک کردن معنی آنچه خوانده شده است
(۲) مشکلاتی در رابطه با هجی کردن
(۳) مشکلاتی در رابطه با بیان نوشتاری
(۴) مشکلاتی در رابطه با تعامل اجتماعی

۲۸۰. پیشرفت تحصیلی کم غیرمنتظره ویژگی توصیف‌کننده کدام اختلال است؟

- (۱) ADHD
(۲) سلوک
(۳) اختلال یادگیری خاص
(۴) اوتیسم

۲۸۱. اختلال واج‌شناختی در DSM-5 به کدام یک از موارد زیر تغییر یافته است؟

- (۱) اختلال زبان
(۲) اختلال صدای گفتار
(۳) لکنت زبان
(۴) اختلال فصاحت با شروع کودکی